



Användarinstruktion för Hexafluorine®

För behandling av stänk av Fluorvätesyra eller dess derivat i ett surt medium*


PÅBÖRJA SKÖLJNING INOM EN MINUT



För sköljning av ett öga (inom 10 sek)



Använd
1 Flaska
500ml



För sköljning av kroppen (inom 1 min)



Använd
1 DAP
5L

I samtliga fall så skall läkare uppsökas efter behandling.

Beroende på företagets rekommenderade behandlingsrutiner så kan applicering därefter ske av speciella motgifter såsom kalcium gluconate.

Om påbörjandet av sköljningen fördröjts kan ett användande av ett motgift vara lämpligt på grund av de kemiska reaktioner i kroppen som kan uppstå vid en skada av fluorvätesyra.

* Begränsad effekt mot basiska kemikalier. Använd Diphoterine® för detta ändamål.

Användarinstruktion för Hexafluorine®*

Påbörja sköljning **inom en minut** efter det att olyckan inträffat, prioritera de **oskyddade kroppsytorna**.

Avlägsna kläder och/eller kontaktlinser.

Fortsätt omedelbart med behandlingen av de nu **blottlagda kroppsytorna**. Ta ej på kläder igen som blivit utsatta för stänk av kemikalier eller som blivit våta av sköljningen.

Kontakta läkare.

GENERELLA INSTRUKTIONER

Fördröj aldrig påbörjandet av behandlingen.

För optimalt resultat, använd Hexafluorine® som **första behandlingsmetod**. Om Hexafluorine® inte finns att tillgå initialt, använd vatten och skölj sedan med Hexafluorine® så fort som möjligt.

Använd hela innehållet i behållaren.

Om behandling påbörjas **efter en minut**, förläng sköljningen av den utsatta ytan med Hexafluorine® med **3 till 5 minuter gånger tiden som hunnit passera innan sköljning påbörjas**. I fallet med en fördröjd påbörjad sköljning av stänk i ögat, så är det ej nödvändigt att fortsätta sköljningen längre än 15 minuter.

Beroende på företagets rekommenderade behandlingsrutiner så kan applicering därefter ske av speciella motgifter såsom kalcium gluconate.

Kontakta sedan läkare omedelbart

Efter behandling av ögat, kan **Natriumklorid vätska** användas för att underlätta en snabbare återhämtning av ögat till dess fysiologiska normaltillstånd.

Om **munhålan** utsatts för stänk av kemikalien, skölj munnen med Hexafluorine® och spotta sedan ut det.

Om **hörselgången** utsatts för stänk av kemikalien, skölj så fort som möjligt med Hexafluorine® genom att spruta in 500ml i hörselgången och samtidigt luta huvudet åt ena sidan för att möjliggöra för vätskan att flöda ut ur örat.

Som i samtliga fall med ensidig sköljning av ett öra med en rumstempererad vätska, så kan yrsel uppstå. Det är ej farligt och kommer att försvinna inom ett par minuter.

Behållare

Flaska (500ml)
DAP (5L)

Rekommenderad behandlingstid

3 minuter
5 minuter

* Begränsad effekt mot basiska kemikalier. Använd Diphoterine® för detta ändamål.



PREVOR

ANTICIPATE AND SAVE

Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management