


Calcium Gluconate Gel 2,5%



Tub 40 g / Burk 500g

För Första Hjälpens behandling vid brännskador av fluorvätesyra på huden.

Endast för utvärtes bruk. Får EJ användas i ögonen eller på öppna sår. Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvaras mellan 8°-25° C. Används ej efter sista förbruknings datum.

Engångsprodukt: tub som är öppnad och/eller använd skall kasseras.

Instruktion:

- Avlägsna kontaminerade kläder, skydda händerna med för ändamålet avsedda handskar.
- Spola huden rikligt med vatten i max 1 minut, eller med alternativ dekontamineringsvätska.
- Applicera Calcium Gluconate Gel generöst på och omkring det utsatta området och massera in det i huden minst 15 minuter efter att smärtfrihet uppnåtts. Applicera ytterligare gel om smärtan återkommer.
- Uppsök snarast läkare. Proceduren kan upprepas under transport till sjukhus.

Distributör:

Medical Care System MCS AB
Industrivägen 5
642 34 FLEN
Sverige

Tel: +46 (0)157 131 31
Fax: +46(0)157 137 44
www.medicalcare.se
E-post: info@medicalcare.se

Tillverkare:

Kays Medical,
3/7 Shaw Street,
Liverpool
Merseyside L6 1HH, UK

Rev.2014-01-27